

***Mycetophagus ater* Reitter (Col. Mycetophagidae).
Un amateur de taillis de charme, pas très rare en Alsace**

par Henry Jacques CALLOT (*) & Francis MATT (**)

(*) 3, rue Wimpheling, F-67000 Strasbourg

(**) 12, rue de l'École, F-57820 Hultehouse

INTRODUCTION

Mycetophagus ater Reitter a la réputation d'être extrêmement rare en France et n'est connu que de trois captures effectuées dans l'Oise : Forêt d'Halatte en 1936 et Forêt de Compiègne en 1985 et 1988 (DENOSMAISON & VERNIER, 1988 ; ROGÉ, 1992). Il ne semble guère plus fréquent en Europe Centrale et VOGT « Die Käfer Mitteleuropas » (1967) l'indiquait comme « espèce sibérienne dont la présence relictuelle est signalée de l'Est de l'Autriche ». Le supplément à cet ouvrage daté de 1992 signale également une population relictuelle dans le sud de la Hesse, sans plus de détails. L'impression générale est celle d'une grande rareté et pourtant la présente note va démontrer, qu'au moins en Alsace, la rareté de *Mycetophagus ater* est très relative et probablement due à la méconnaissance de son habitat.

*
* *

La première capture alsacienne date de 1993 : Kastenwald, commune d'Appenwihr (Haut-Rhin) 8-VII-1993, 4 ex. au battage d'une branche morte de charme d'un diamètre de 4 à 5 cm (F. Matt). Cette première donnée a été complétée par une série de captures (35 exemplaires) effectuées au printemps 1994 dans le cadre d'une étude sur la faune des branchages et bois morts sur pied minces (CALLOT, 1994) :

— Forêt de Nordhouse (Bas-Rhin), alt. 150 m, 7-V-1994, tige de frêne à l'écorce partiellement déhiscente, 4 ex. (Callot).

— Forêt de Drusenheim (Bas-Rhin), alt. 125 m, 12-V-1994, taillis de charme, 5 ex. (Callot).

— Forêt de Wasselonne (Bas-Rhin), alt. 410 m, 22-V-1994, jeune charme mort sur pied, 1 ex. (Callot).

— Spitzmatt, commune de Matzenheim (Bas-Rhin), alt. 160 m, 28-V-1994, taillis de charme, 8 ex. (Callot).

— Kastenwald, commune d'Appenwihr (Haut-Rhin), alt. 190 m, 11-VI-1994, taillis de charme, 7 ex. (Callot).

— Bois de Soufflenheim (Bas-Rhin), alt. 120 m, 12-VI-1994, taillis de charme, 3 ex. (Callot).

— Pfifferwald, commune de Sand (Bas-Rhin), alt. 160 m, 18-VI-1994, taillis de charme, 1 ex. (Callot).

— Forêt d'Altorf (Bas-Rhin), alt. 180 m, 19-VI-1994, taillis de charme, 6 ex. (Callot).

Toutes ces captures s'étalent sur deux bons mois, sont réparties des rives du Rhin au piedmont vosgien et sur 90 km à vol d'oiseau.

L'insecte n'est donc pas très rare, et de loin, en Alsace et son habitat semble pouvoir être cerné avec une bonne précision. *Mycetophagus ater* apprécie particulièrement les branchages morts de charme en position verticale ou proche, tels que l'on peut les trouver en abondance dans les secteurs de taillis. Ces tiges ont entre 2 et 6 cm de diamètre, sont mortes depuis un temps suffisant pour que l'écorce, de coloration tirant sur le roussâtre, commence un peu à se détacher et à s'enrouler sur elle-même par endroits. Le bois est encore ferme et sec et aucun champignon autre que des espèces très discrètes et encroûtantes n'est présent. Seule la capture de la Forêt de Nordhouse diverge un peu puisqu'il s'agissait d'une branche de frêne, présentant cependant des caractéristiques analogues. Cet habitat est suffisamment typé pour qu'en fait les quatre dernières données correspondent à la recherche ciblée de *Mycetophagus ater* dans des taillis de charme semblant a priori favorables — et c'était le cas.

Dans son taillis *Mycetophagus ater* est accompagné d'une série d'espèces également spécialisées dans les branchages verticaux et les très jeunes arbres morts sur pied. On peut citer entre autres des *Melandryidae* comme *Tetratoma ancora* F., assez commun, de très nombreux *Pythidae* (*Rhinosimus*, *Vincenzellus*, *Lissodema*), *Anobiidae* et *Cisidae*, *Synchita humeralis* F. (*Colydiidae*) (encore que beaucoup moins commun que sur le noisetier), etc. (pour plus de détails voir CALLOT, 1995).

L'un des auteurs (F. M.) remercie M. J. ROGÉ des renseignements qu'il lui a aimablement fournis.

BIBLIOGRAPHIE

- CALLOT (H. J.), 1995. — Coléoptères des branchages et tiges mortes de taillis. Essai d'inventaire pour l'Alsace. — *Bull. Soc. ent. Mulhouse*, 1, janv.-mars.
- DENOSMAISON (J. C.) & VERNIER (D.), 1989. — Coléoptères intéressants capturés en Forêt de Compiègne, *L'Entomologiste*, 45 : 88.
- LOHSE (G. A.) & LUCHT (W. A.), 1992. — Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 2^e Supplément, p. 160.
- ROGÉ (J.), 1992. — Synopsis des espèces françaises appartenant au genre *Mycetophagus* Hellwig, 1792 (*Coleoptera Mycetophagidae*) — *Bull. mens. Soc. Lim. Lyon*, 61 : 288.
- VOGT (H.), 1967. — *Mycetophagidae* in FREUDE H., HARDE K. W. & LOHSE G. A. — DIE KÄFER MITTELEUROPAS. — GOECKE & EVERS, KREFELD, TOME 7, P. 194.