

## Notes de chasse et Observations diverses

### — Deux nouveaux *Mycetophagidae* pour la faune d'Alsace : *Typhaea decipiens* Lohse et *Litargus balteatus* LeConte (*Coleoptera*, *Mycetophagidae*).

Mes premières captures de *Typhaea decipiens* datent de l'été 1993. Deux exemplaires ont été pris à Strasbourg attirés par une lampe UV placée sur un balcon urbain. Deux autres ont été pris en 1994 et 1996. Une petite série (7 exemplaires) a ensuite été récoltée par fauchage du bas-côté d'une route industrielle du port de la même ville. Signalons que cette zone industrielle comporte des silos, moulins industriels et tours de malterie. La première capture en rase campagne date de septembre 1997 : Bois de Gamsheim (Bas-Rhin), 7-IX-1997, tas de céréales avariées, 1 exemplaire. Une campagne automnale d'inventaire des tas de grains avariés en fermentation a révélé quelques très bonnes stations où l'insecte pullule : Mutzenhouse (Bas-Rhin), 24-IX et 15-XI-1997, tas de grains (colza, céréales) en fermentation très active (*Matt, Callot*), Krautwiller (Bas-Rhin), XI et XII-1997, tas de grains de blé avariés (*Matt*), etc.

Un premier tri entre *T. decipiens* et *T. stercorea* (L.) est très facile : *T. decipiens* est plus sombre, plus étroit, et plus petit que *stercorea* (pour le même sexe, les fourchettes de taille ne se recouvrent pratiquement pas). Autre caractère externe très facile à apprécier : la pilosité latérale est peu écartée chez *stercorea*, saillante chez *decipiens*. Les pièces génitales des deux espèces sont assez différentes. En particulier les paramères de *decipiens* sont presque parallèles, ceux de *stercorea* un peu renflés au milieu de leur longueur, et légèrement étranglés à environ un cinquième de la base. L'édéage de *decipiens* est très trapu, les paramères représentant environ les deux cinquièmes de la longueur, celui de *stercorea* plus étiré, les paramères représentant la moitié de la longueur.

*Litargus balteatus* est présent dans une bonne partie de la France depuis quelques années. Ma première capture date de septembre 1997 : Balbronn (Bas-Rhin), 13-IX-1997, litière de vieille paille, 1 exemplaire. Depuis, de nombreuses captures ont été effectuées par F. MATT et moi-même dans des détritux végétaux variés : vieux foin, silos à maïs-fourrage, paille en décomposition, grains avariés. L'espèce est localement abondante, largement répandue en rase-campagne, et probablement établie dans la région depuis plusieurs années.

Pour plus de détails sur ces captures et celles des nombreux autres coléoptères de familles voisines qui pullulent dans les détritux végétaux alsaciens, je conseille au lecteur de consulter le *Catalogue et Atlas des Coléoptères d'Alsace* consacré à un premier lot de « Clavicornes » et dont la parution est prévue pour l'hiver 1998.

#### BIBLIOGRAPHIE

- BOUYON (H.), 1997. — Coléoptères d'une décharge rurale en Ile-de-France. — *L'Entomologiste*, 53 : 197-202.  
 LOHSE (G.-A.), LUCHT (W. H.), 1992. — Die Käfer Mitteleuropas. Supplément au tome 7.  
 ROGÉ (J.), 1994. — Seizième note sur les Coléoptères du sud-ouest de la France. — *L'Entomologiste*, 50 : 279-283.

Henry CALLOT, 3, rue Wimpheling, F 67000 STRASBOURG  
 (callot@chimie.u-strasbg.fr)