

## Mises à jour des Catalogues et Atlas des Coléoptères d'Alsace du 21-IX-2020

### Important

À partir de la fin de l'année 2020 les mises à jour changent de formule. Toutes sont regroupées en un seul document téléchargeable, chaque entomologiste pouvant ensuite choisir, soit de profiter de cette vue d'ensemble, soit consulter ce qui correspond à la famille qui l'intéresse dans les paragraphes consacrés au catalogue correspondant.

### Tome 1

#### Cerambycidae

**87 79 03 *Acanthocinus griseus*** (F.) pour lequel nous n'avions que des données anciennes peu fiables est présent dans le Haut-Rhin : Forêt Communale de Pfaffenheim (68), ND du Schauenberg, 21-VII-2019, 3 ex. (Ehrhardt).

***Saperda perforata*** (Pallas, 1773). La donnée la plus récente datait de 1972, du Bas-Rhin. L'insecte a été observé récemment dans le Haut-Rhin : Wittelsheim (68), RNR Rothmoos, 14-VI-2019, 1 ex. à la lampe UV (Ehrhardt).

### Tome 3

#### Buprestidae

***Anthaxia fulgurans*** (Schrank, 1789) est également présent dans le sud du Bas-Rhin : Marckolsheim (67), 27-VI-1993, 2 ex. (Matt).

***Anthaxia podolica*** Mannerheim, 1837 est aussi présent dans le Haut-Rhin : Ungersheim (68), Ecomusée d'Alsace, 19-VI-2019, 1 ex. (Ehrhardt).

***Coroebus elatus*** (Fabricius, 1796) n'était connu que de Rouffach (68), Bollenberg. Il est aussi présent dans la Hardt : Niederentzen (68), Niederfeld, 13-VI-2019, fauchage de pré sec, 2 ex. (Callot).

**38 20 22c *Agrilus ribesi*** Schaeffer, 1946 a été observé sur des groseilliers dans le Haut-Rhin : Cernay (68), 2 et 16-VI-2019, 3+2 ex.; Ungersheim (68), Ecomusée d'Alsace, 19-VI-2019, 1 ex. (Ehrhardt).

**38 20 37 *Agrilus roscidus*** Kiesenwetter, 1857, a été pris au battage de rosacées buissonnantes (aubépines et prunelliers) à St Nabor (67), 27-VII-2020, 1 ex., et à Donnenheim (67), 3-VIII-2020, 1 ex. (Callot). Les quelques "données" anciennes pour cet insecte plutôt méridional sont à rejeter car de P. Scherdlin.

## Tome 4

### Trogidae

**85 01 06 *Trox perrisii*** Fairmaire, 1868 a été capturé à Strasbourg (67), 16-IV-2020, lampe UV proche du Jardin Botanique, 1 ex. (Callot).

### Aphodiidae

***Coprimorphus scrutator*** (Herbst, 1789). Cet insecte était surtout connu par des données très anciennes, certaines invérifiables, et de rares données assez récentes du Bas-Rhin. Il a été observé très récemment dans le Haut-Rhin : Wattwiller (68), Molkenrain, 1074 m, 11-VIII-2019, 15 ex. dans des bouses de vache (Ehrhardt).

## Tome 5

### Carabidae

**1 27 03 *Paratachys fulvicollis*** (Dejean, 1831) a été capturé à Strasbourg (67), lampe UV à l'arrière du Musée Zoologique, 30-VI-2019, 1 ex. (Callot).

## Tome 6

### Scolytinae

***Hylastes linearis*** Erichson, 1836 est confirmé de Strasbourg (67), Jardin Botanique, 8-V-2020, piège-vitre, 1 ex. (Callot).

**91 20 01bis *Crypturgus subcribrosus*** Eggers, 1933. Cette espèce récemment réhabilitée et longtemps confondue avec *C. cinereus* est présente dans les deux départements alsaciens. Pour le détail des données voir : Moucheron, Callot & Barnouin (*Lambillionea*, sous presse fin 2020).

## Tome 7

### Histeridae

***Margarinotus merdarius*** (Hoffmann, 1803) n'était connu que par une donnée assez ancienne (1987). Sa présence dans le Bas-Rhin est confirmée : Strasbourg (67), Jardin de l'Observatoire, 17-VII-2020, piège-vitre, 1 ex. (Callot).

## Tome 8

### Apionidae

***Aspidapion validum*** (Germar, 1817) a été confirmé pour le Bas-Rhin par la capture d'un exemplaire sur guimauve (*Althea officinalis* L.) au Jardin Botanique de Strasbourg, 29-VIII-2019 (Callot).

***Trichopterapion holosericeum*** (Gyllenhal, 1833) : l'expansion vers le Nord de cet insecte se poursuit et il est maintenant présent dans le Bas-Rhin : Forêt de Haslach (67), 4-XI-2017, 1 ex. au cardage de mousses, et Forêt de Brumath (67), 16-IX-2019, 1 ex. au fauchage (Callot).

## Tome 10

### Curculionidae

***Lixus ochraceus*** Boheman, 1842 est aussi présent dans le Haut-Rhin : Wittelsheim (68), 15-VII-2019, 1 ex. (Ehrhardt); Niederhergheim (68), 26-VI-2020, au fauchage d'une friche, 1 ex. (Callot).

***Rhabdorhynchus echii*** Brahm est également présent au nord de Strasbourg : La Wantzenau (67), 23-VI-2020, digue rhénane, 1 ex. (Callot).

## Tome 13

### Chrysomelidae

***Donacia clavipes*** Fabricius, 1792 est encore présent sur le versant Ouest des Vosges, alors que la dernière donnée pour le versant Est date de 1990 : Sarrewerden (67), 4-VII-2017, sur nénuphar jaune (Matt). Également présent en Moselle proche.

**88 02 22 *Donacia tomentosa*** Ahrens, 1810 est encore présent sur le versant Ouest des Vosges et une donnée concerne le Bas-Rhin : Sarrewerden (67), 4-VII-2017, 1 ex. sur *Butomus* (Matt). Également présent en Moselle proche.

## Tome 15

### Staphylinidae

***Eusphalerum sorbi*** (Gyllenhal, 1810) est présent dans le Haut-Rhin : Forêt Domaniale de Guebwiller, 29-V-2019 (Fuchs, ONF).

***Bisnius puella*** (Nordmann, 1837). Cet insecte montagnard n'était connu que par 2 données du Hohneck. Il est confirmé des Hautes Vosges : Sewen, Forêt de la Vallée de la Doller, 1070 m, 26-VI-2019, 1 ex. (Fuchs, ONF).

***Philonthus nitidicollis*** (Lacordaire, 1835) n'était connu que d'une donnée assez ancienne (1986). Il a été retrouvé à Strasbourg (67), Jardin Botanique, 8-V-2020, 1 ex. au piège-vitre (Callot).

**23 117 018 *Tachinus rufipennis*** Gyllenhal, 1810 a été capturé dans les Hautes Vosges : Forêt Domaniale de Guebwiller, près du Lac de la Lauch, 950 m, 29-V-2019, 1 ex. (Fuchs, ONF).

***Enalodroma hepatica*** (Erichson, 1839) est présent dans le Haut-Rhin : Orbey (68), Forêt Domaniale des Deux Lacs, 2019, 1 ex. au piège-vitre (Fuchs, ONF).

**23 190 002 *Alevonota egregia*** Rye, 1875 est présent en Alsace : Strasbourg (67), Jardin Botanique, 26-V-2015, piège-vitre, 1 ex. (Callot).

***Zyras haworthi*** (Stephens, 1832) est présent dans le Haut-Rhin : Orbey (68), Forêt Domaniale des Deux Lacs, 2019, 1 ex. au piège-vitre (Fuchs, ONF).

***Zyras (Pella) cognatus*** (Märkel, 1842) est confirmé du Bas-Rhin : Reipertswiller (67), Hengstberg, 24-IV-2019, 1 ex. (Fuchs, ONF).

***Zyras (Pella) laticollis*** (Märkel, 1842) est également présent dans le Bas-Rhin : Strasbourg (67), Jardin Botanique, 25-V-2018, piège au vinaigre, 1 ex. (Callot).

***Meotica exilis*** (Erichson, 1837) est confirmé du Bas-Rhin par une deuxième donnée : Forêt de Haguenau (67), Rendel, 15-IV-2017, cardage de mousses, 1 ex. (Callot).

## Tome 16

### Tenebrionidae

**83 23 05 *Corticeus suberis*** (Lucas, 1846). Espèce très rare à l'échelle européenne capturée à Oberbruck (68), Forêt Départementale de la Vallée de la Doller, 1000 m, 1 ex. au piège-vitre (Fuchs, ONF).

## Tome 18

### Trogossitidae

**48 07 01 *Ostoma ferruginea*** (L., 1758) est présent dans les Vosges du Nord : Sparsbach (67), 2-V-2019 (Matt).

#### Citation :

CALLOT H., 2020. - Mises à jour des Catalogues et Atlas des Coléoptères d'Alsace du 21-IX-2020. Société Alsacienne d'Entomologie. 4 p.